


engines

CLGE 2005

9- Enfant de 9 ans, dysphagie, T° 38°5
26 kgs, 130 cm




izvadene nepčane mandule

L'angine érythémateuse ou érythémato-pultacée



Virale ou
**Streptocoque β -
hémolytique du
groupe A (SGA)**

- 25 à 40% chez l'enfant
- 10 à 25 % chez l'adulte




izvadene neplane mandule

Diagnostic clinique angine

Fondé sur 5 critères cliniques
(canadien)

- Fièvre
- Absence de toux
- Exsudat amygdalien
- Hypertrophie douloureuse des ganglions cervicaux antérieurs
- Age : 3ans < âge < 14 ans,
1 point de moins si : > 45 ans



izvadene nepčane mandule

Diagnostic clinique angine


Score canadien résultats

- Sensibilité = 85%, Spécificité = 92,1%
- Probabilité d'infection à SGA (VPP)
(revue Prescrire)

0 ou 1 : dg d'angine écarté

4 ou 5 : dg d'angine retenu


2 ou 3 : faire streptotest



izvadene nepčane mandule


Diagnostic clinique angine

- Les recommandations Nord-américaines font une large place aux score cliniques méthodiques
- Les recommandations françaises
 - ne reconnaissent pas l'intérêt des scores cliniques
 - privilégient le diagnostic d'angine à SGA par les TDR



izvadene nepčane mandule

10- Enfant de 8 ans, T° 39°, vomissements et dysphagie




izvadene neplane mandule

Un cas particulier : la scarlatine




- Toxi-infection / exo-enzyme érythrogène
- SGA (exception C ou G)
- 13 pour 100 000 habitants en 2001 au Québec



izvadene nepčane mandule

Un cas particulier : la scarlatine




- L'angine érythémateuse, avec adénopathies sous-angulo-maxillaires.
- Après 1 à 2 jours: exanthème rapidement progressif (sans intervalle de peau saine, prédominant aux plis de flexion mais respectant les extrémités et la région péri-buccale),
- Énanthème: langue d'abord saburrale et devenant rouge framboisée au 5ème jour, de grande valeur diagnostique dans les formes atténuées.
- rechercher une protéinurie à la 3ème semaine.



izvadene nepčane mandule

Enfant de 4 ans, fébrile, dysphagique, adénopathies sous maxillaires




izvadene nepčane mandule



L'angine vésiculeuse



- Toujours virale
- Herpangine, due à un entérovirus (coxsackie du groupe A)
- Gingivo-stomatite herpétique



izvadene neplane mandule




izvadene nepčane mandule

L' angine pseudo-membraneuse






- SGA
- MNI surtout
- diphtérie
(exceptionnelle en France mais pas dans l'est de l'Europe)



izvadene neplane mandule

Mononucleóse



izvadene neplane mandule