

Dépistage du Diabète Gestationnel

Congrès SASPAS 16.10.2012

Chloé LADOUS, 5^o semestre

Indications du dépistage:

- Présence d'au moins 1 des critères suivants:
 - Age maternel ≥ 35 ans
 - IMC ≥ 25
 - ATCD de diabète chez les apparentés du 1^o degré
 - ATCD personnel de DG ou d'enfant macrosome
- Pas d'arguments pour dépistage systématique

Méthodes de dépistage

- 1° trimestre si FDR: GAJ
- Entre 24-28SA: HGPO (75g de sucre avec mesure des glycémie à 0, 1 et 2h)
- 3° trimestre: au minimum GAJ
- Si biométries fœtales $\geq 97^{\circ}$ percentile ou hydramnios chez une femme sans FDR: indication de recherche de DG.
- Glycosurie ne sert à rien!

Critères diagnostiques

- Seuil GAJ
 - ≥ 0.92 g/l (5.1mmol/l)
- HGPO
 - GAJ ≥ 0.92 g/l, et/ou à 1h glycémie ≥ 1.80 g/l (10mmol/l), et/ou à 2h ≥ 1.53 g/l (8.5mmol/l)
- Si c'est le cas: envoi chez gynéco pour suivi de grossesse à risque