


Conduite à tenir en cas de piquêre(s) de tique(s).

Congrès SASPAS
16/10/2012

Charlotte DROT

Mode de retrait/soins locaux

- TIRE-TIQUE



- ✓ Ne comprime pas l'abdomen
 - ✓ Sens inverse aiguilles d'une montre
 - ✓ Jamais d'éther ni d'alcool
 - ✓ Bien désinfecter ensuite
- Ou à la pince...

Antibiothérapie(1)

- **Systematique :**

- ✓ **Femme enceinte**
- ✓ **Erythème chronique migrant (ECM)**



- **A envisager :**

- ✓ **Durée d'attachement de la tique supérieur à 48-72 heures** (ou tique gorgée de sang)
- ✓ **L'enfant < 8 ans** (surtout si multiples piqûres et attachement > 48 h)
- ✓ Patients **immunodéprimés**

Antibiothérapie(2)

- Traitement :
 - ✓ **Dans les 72h, sans réalisation de sérologie :**
 - **Doxycycline** 200mg/j, 10 à 14 jours (attention : CI enfants < 8ans et femmes enceintes ou allaitantes)
 - **Amoxiciline** 3g/j, 10 à 14 jours (enfants : 50mg/kg/j)
 - Les signes cutanés peuvent mettre 1 mois à disparaître...

Prévention primaire

- Rappeler les mesures de prévention aux patients :
 - ✓ **Vêtements couvrants**
 - ✓ Répulsifs à base de **DEET** (connaitre les précautions d'emploi. Concentration à 50% chez l'adulte, 20% chez la femme enceinte après le 1er trimestre (CI) et 30% chez l'enfant)
 - ✓ Examen soigneux du corps
 - ✓ ...

Petits rappels !

- **Allaitement possible:** Il n'y a pas de risque de transmission de *Borrelia* par le lait maternel.
- Bien penser au rappel de la **vaccination antitétanique**.
- **Surveillance attentive pendant 30 jours .**
- **La tique ne transmet pas que *Borrelia Burgdorferi* !!**
 - la fièvre récurrente (autre borréliose),
 - la méningo-encéphalite à tiques (virus TBE),
 - la tularémie (ulcération et ADP douloureuse),
 - la fièvre Q (*Coxiella Burnettii*),
 - la fièvre boutonneuse méditerranéenne (rickettsiose),
 - arboviroses et babésiose (protozoaire, allure pseudo-palustre),...
 - **Y penser !**

Bibliographie

- Vidal Recos 2012, 4^{ème} édition, Lyme (maladie de), p.1280-1289.
- Borréliose de Lyme: démarches diagnostiques, thérapeutiques et préventives, SPILF; décembre 2006.
- Revue Prescrire
 - « Attention aux tiques, Infos-Patients Prescrire », juin 2011,
 - « Prévention des piqûres de moustiques ou des morsures de tiques, Idées-Forces Prescrire », mise à jour avril 2011,
 - « La maladie de Lyme », janvier 1993; 13(125):23-27
 - « Vaccin méningo-encéphalite à tiques » juillet 1997; 17 (175): 487-490 +(176): 628.
- CHU Besançon, Service des maladies infectieuses et tropicales. Conduite à tenir devant une piqûre de tique, Rédaction: Dr J.Leroy le 05 juillet 2005
MAJ 13/07/2012.