

Prise en charge des pédiculoses de la tête

CONGRES SASPAS avril 2014
BEDOUET



Rappels



- Pédiculose de la tête ou « poux »: Infestation du cuir chevelu par le pou de la tête : *Pediculus humanus var. capitis*
 - ▶ Prurit du cuir chevelu diffus ou à prédominance rétro auriculaire. Diagnostic facile: découverte de poux vivants et de lentes.
 - ▶ Transmission inter-humaine directe ou indirecte - ne transmet aucune maladie

Types de traitement:

- Peignage au peigne fin
- Insecticide: Malathion ou Pyrethrine
- Substance d'action physique: dérivés siliconés (**dimeticone**), Myristate d'isopropyle, 1,2-octanédiol

Bien choisir sa galénique:

- ▶ **Lotion**
- ▶ Shampoing
- ▶ Aérosols



Et en pratique?

- 1 application sur cheveux secs (le temps d'application diffère selon produit choisi, divisé par 2 chez l'enfant de moins de 2 ans)
- Rinçage au shampoing doux
- Traitement 7 à 10 jours plus tard
- Décontaminer les objets
- Pas d'éviction scolaire - Traitements concomitants de toutes les personnes infestées - pas de traitement « préventif »

- Eviter insecticide chez le moins de 6 mois
- Préférer dimeticone ou pyrethrine chez la femme enceinte
- CONTRE INDICATION forme en aérosols chez asthmatique

- 15 euros, non remboursé